

NEPOTREBNA I NEPRAVILNA ISHRANA ODOJČETA MLEČNIM FORMULAMA UZ PREKID DOJENJA UKLJUČENA JE SA SLEDEĆIM RIZICIMA:

Za odojčad i decu:

- povećan rizik od astme
- povećan rizik od alergija
- ograničen kognitivni razvoj
- povećan rizik od akutnog respiratornog distresa
- povećan rizik od nepravilnog zagrižaja
- povećan rizik od infekcija zbog zagađenih mlečnih formula
- povećan rizik od nutritivnih deficita
- povećan rizik od nastanka raka u detinjstvu
- povećan rizik od hroničnih bolesti
- povećan rizik od kardiovaskularnih bolesti
- povećan rizik od nastanka šećerne bolesti
- povećan rizik od nastanka gojaznosti
- povećan rizik od nastanka gastrointestinalnih zapaljenskih bolesti
- povećan rizik smrtnosti
- povećan rizik upala srednjeg uha

Za majke:

- povećan rizik od karcinoma dojke
- povećan rizik od prekomerne telesne mase
- povećan rizik od karcinoma jajnika i endometrijuma
- povećan rizik od osteoporoze
- povećan rizik od reumatoidnog artritisa
- povećan rizik od stresa i anksioznosti
- povećan rizik od šećerne bolesti u materinstvu